



# Różności w kolorowej rzeczywistości

Bartłomiej BZDEGA


Ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia kacik jest kolorowy, niczym lampki choinkowe. Na stole znajdujemy kolorowe zadania – o dowodzeniu istnienia jednokolorowych obiektów w wielokolorowych rzeczywistościach.

Załóżmy, że mamy dany zbiór  $A$ , którego każdy element pokolorowano jednym z  $k$  kolorów. Chcemy wykazać, że istnieje jakiś podzbiór  $C$  zbioru  $A$ , który ma wszystkie elementy tego samego koloru, a jednocześnie spełnia zadany dodatkowy warunek. Idea dowodu zwykle jest następująca. Wybieramy pewien zbiór  $B \subset A$  i przeprowadzamy dowód istnienia jednokolorowego  $C \subset B$ . Brzmi to dziwnie, ale czasem *zmniejszenie* zbioru powoduje *uproszczenie* rozwiązania.

Pokażę przykład wyżej opisanego postępowania. Należy on do matematycznego folkloru.

**Zadanie.** Jeśli każdy punkt płaszczyzny pomalowano na czarno lub na biało, to pewne cztery punkty tego samego koloru są wierzchołkami prostokąta.

**Rozwiązanie.** Rozważmy prostokąt złożony z  $9 \times 3$  punktów płaszczyzny.



Każdy *słupek* (trzy punkty w jednym pionie) ma co najmniej dwa punkty w tym samym kolorze. Ponadto pewne dwa słupki są identyczne (niech to będą  $A$  i  $B$ ), gdyż trzy punkty można pokolorować na  $2^3 = 8$  sposobów. Słupek  $A$  ma dwa punkty tego samego koloru na tym samym poziomie, co słupek  $B$  – to daje poszukiwaną prostokąt.

Problemy podobnego typu matematycy nazywają *ramseyowskimi* – są bowiem podobne w sformułowaniu do słynnego twierdzenia Ramseya, które zapewne jeszcze się kiedyś pojawi w tym kaciku. (O twierdzeniu Ramseya pisaliśmy już w  $\Delta_{08}^3$  oraz  $\Delta_{17}^4$ ).

## Zadania

- Każdy punkt płaszczyzny pomalowano na żółto lub na niebiesko. Udowodnić, że:
  - pewne dwa punkty tego samego koloru są końcami odcinka o długości 1;
  - pewne trzy punkty tego samego koloru są wierzchołkami trójkąta prostokątnego równoramiennego (*IV Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, etap I, zadanie 6*);
  - pewne trzy punkty tego samego koloru są wierzchołkami trójkąta równobocznego.
- Rozwiązać podpunkt (a) z poprzedniego zadania dla trzech kolorów.
- Każdy punkt płaszczyzny pomalowano jednym z  $n$  kolorów. Udowodnić, że pewne cztery punkty tego samego koloru są wierzchołkami prostokąta.
- Każdy punkt przestrzeni pokolorowano jednym z  $n$  kolorów. Udowodnić, że pewien prostopadłościan ma wszystkie wierzchołki tego samego koloru.
- Każdy punkt okręgu pokolorowano na czerwono lub zielono. Udowodnić, że pewne trzy punkty tego samego koloru są wierzchołkami trójkąta równoramiennego.
- Rozwiązać zadanie analogiczne do poprzedniego dla trzech kolorów (*LI Olimpiada Matematyczna, etap I, zadanie 4*).
- Każdy punkt sfery pomalowano na czarno lub biało. Dowieść, że pewne trzy punkty jednakowego koloru są wierzchołkami trójkąta równobocznego (*IX Mała Olimpiada Matematyczna, etap II, grupa starsza, zadanie 3*).

**Wskazówki do zadań**

1. (a) Rozważmy wierzchołki trójkąta równobocznego o boku 1. (b, c) Znać od dwóch punktów jednakowego koloru, które wymuszają inny kolor kolejnych punktów. Kontynuując takie „wymuszanie”, dojdzie się do tezy: „wymuszanie” takie punkty  $A, B, C, D, E, F, G$ , że trójkąty  $ABC, BCD, EFG, FGA$  są równoboczne o boku 1 oraz  $|DE| = 1$ .

**Ciekawostka.** Problem znalezienia najmniejszej liczby kolorów, którymi można tak pokolorować płaszczyznę, by nie było odcinka długości 1 o końcach tego samego koloru, nosi nazwę *problemu Hadwiger-Nelsona*. Dziś wiadomo, że liczba ta, zwana *liczbą chromaticzną płaszczyzny*, należy do zbioru  $\{5, 6, 7\}$ .

3. Postąpić tak jak w przykładowym zadaniu. Słupki muszą liczyć tyle zagwarantowane dwa punkty tego samego koloru, aby istnienie dwóch identycznych duża, aby istnienie dwóch identycznych było zapewnione.

4. Zbudować dyskretny prostopadłościan, kopując układy punktów z poprzedniego zadania. Liczba odpowiedzi licząc raz, na równoległych płaszczyznach.

5. Każde trzy wierzchołki pięciokąta foremnego wyznaczają trójkąt równoramienny.

6. Wśród każdych pięciu wierzchołków trójkiata foremnego znajdują się trzy bęące wierzchołkami trójkąta równoramiennego. Teza zadania (a) nawet coś znaczenie mocniejszego wynika z następującego *twierdzenia van der Waerdena*: Dla każdej pary  $(k, d)$  liczb całkowitych dodatnich istnieje taka liczba  $n$ , że dla każdego kolorowania liczb  $1, 2, 3, \dots, n$  za pomocą  $k$  kolorów znajdziemy jednokolorowy ciąg arytmetyczny długości  $d$ .

7. Rozważyć dwudziestokąt foremny wpisany w daną sferę. Uwaga – nie tylko ściany dwudziestokąta foremnego są trójkątami równobocznymi wyznaczonymi przez jego wierzchołki.